

Pratum,

LACVS,
Arundinetum.



P A R I S I I S.

Apud Simonem Colinæum, & Franciscum
Stephanum, eius priuignum.

Cum priuilegio.

3 5 4 3.

PLATE I

THE

PLATE



PLATE II

THE

PLATE

PLATE

CAROLVS STEPHA-

nus, Steph. Tornabullo præfidi

Rhotomagensi S.



Vbium non est,
amplissime Præ-
ses, quin pro sin-
gulari tua erga
omnes humani-
tate, mihi priua-
tim p postremas literas tuas abũ-
de perspecta, Pratũ hoc nostrum
boni cõsulas. Quod munus, quia
nonnullis iudicari poterit exiguũ
nimis ac puerile, aut certe tua au-
thoritate atque amplitudine indi-
gnum : putauĩ mearũ esse partiũ,
non id quidem verbis exornare,
sed in eo consilij mei rationẽ bre-
uiter exponere: ne cuiq̃ facilitate
tua temere abuti, vel nullam om-

A.ij.

nino officij mei rationem habuif-
se videar. Nam quum superiori-
bus hisce mēſibus animi cauſa in
Antonianum tuū me inuiſſes,
quā grato mihi omnia quę illic
eſſent ſpectaculo fuerint, tu ipſe
teſtis eſſe poteſ, à quo toties ob-
iurgatus fui, cū in eam vocē præ-
nimia exhilaratione perſæpe pro-
rumperē, me fundum inſtructio-
rem atq; ornatiorē nunq̃ repe-
riſſe. Adeo poſt amœniſſimū hor-
tū, lētiſſimarum arborū ſemina-
ria optime mihi diſpoſita videbā-
tur: ſaliēta, confluentibus riuulis
irrigata: prata, omniū longē fœcū
diſſima, varijſq; pabulis, herbulis,
floſculis elegātiſſime cōſperſa: ni-
hil vt iucundius atq; amœnius di-
ci aut excogitari potuiſſe exiſti-
marē. Quod quum mihi merito

mīrum in modū placeret, tuásq;
 fortunas plurimū laudarē qui fun-
 dum haberes omni deliciarū gene-
 re confertissimum (cōditionē tuā
 interim paulo asperioribus verbis
 persequens, quæ te à fœlicissimo
 Antoniano, gratissimóq; hoc cō-
 spectu remotius diuelleret) tū qui
 dem mihi venit in mentē, aliquid
 absenti tibi scriptis depingere, qđ
 Antoniani tui lætissima prata an-
 te oculos proponeret: atq; id ali-
 qua ex parte referret: quod tibi
 nō ab re gratissimū esse conspex-
 ramus, nobisq; planē iucūdissimū.
 Id vero dū per otiū obire licebit,
 oculisq; leuissime perlustrare, tibi
 præter herbas, iuncos, flores, fun-
 gos, arundines nostrates, reliquas
 etiā peregrinas atq; externas ostē-
 det: neq; pratenfes tantū, sed & la-

custres, atq; adeo palustres, & quę
locis aquosis ac stagnantibus cre
scere solēt. Tantū hoc vereor, ne
tritis ac vulgaribus quibusdā in
terpretatiūculis, statim in ipso li
mine descriptis aliquātulū offen
daris: quod minus sanè obfuerit,
si quidem ad instituti nostri ratio
nē attenderis, quæ adolescentum
erudiēdorū causa primū suscepta
est: quibus vt omni ex parte satis
faceremus, ea imprimis interpre
tanda atq; explicāda fuerūt. Pro
inde vir amplissime, hoc tuo pra
to eo animo perfruare velim, quo
tibi libere atq; ingenue porrigi
mus: interea dum agrū excolere
licebit, quē propediē vt accipias,
id vero omni cura ac diligētia da
bimus operam. Bene vale, Lutetię
ad xiiij. kalē. Febr. M. D. XLIII.

Caroli Stephani, NI, DE PRATENSI ratione libellus.



I S I superiorum mens-
 sium occupatio, adole-
 scentulorū studijs plu-
 rimum addictum anis-
 mum meum aliò mo-
 lestissime distraxisset:
 non commissem, vt
 hunc laborem, in ex-
 plicanda pratorum ac lacuum ratione tan-
 topere à me expostulassent. Atq; vtinam ea-
 dem opera, quem polliciti sumus agrum, no-
 stris, quantumcunq; rusticis, manibus excul-
 tum nunc exhibere liceret: parum esset præ-
 terea reliqui, quod ad nostræ fidei persolu-
 tionem attinere posset. Verum nihil agendū
 temere, nihil inconsultius efferendum. Quā-
 obrem malo meos adolescentulos paulisper
 adhuc expectare, q̄ inutile prorsus ac vanum
 aliquid à nobis prinus accipere: etsi nō igno-
 rem quæ hactenus acceperunt, nō vsq; adeo
 eis vtilia fuisse, aut vanitate omnino caruis-
 se. Quis enim omnia recte atq; ex omnium
 sententia: attamen hoc dedimus operam, ne
 prorsus essent ingrata atq; inutilia: quod ita

contigisse maximo nobis argumento fuit cōtinuum eorum conuitium, quo non solū ad reliqua perficienda admoneor, sed etiam vehementiss. cogi, impelli atq; vrgeri videor: vt maiora quādam negotia intermittere corū causa, mihi nunc sit necessariū. Agedū, quādo nobis non solum nati sumus, ad prati nostri descriptionem accingamur: de quo priusquam aliquid dico, pauca quēdam mihi præponenda videntur, quę ad instituti atq; ordinis nostri rationem pertineant.

Pratorum itaq; differentias, & culturæ varia vocabula primum exequemur: in tyrunculorum gratiam: quō loco & scēni & instrumentorum ad prati culturam pertinentium fiet à nobis mentio. Post hæc pratenſes herbas (quæ potissima est instituti nostri ratio) breuibus persequemur: vt interim vnā complectamur eas omnes quæ in aquosis & palustribus crescere solēt, quo in loco etiam fungorum genera breuissime percurremus. Exinde lacum describemus: quandoquidem is pratis vicinus esse plerunq; solet: si modo eū intelligatis lacū, qui amœnitatis gratia, aquoso loco defossus est, fluentēmq; & agitatum aquam contineat: quo nomine & à palude & à stagno ac viuario plurimum differt. In eo recensēbimus herbas, quæ nō solum in aquis huiusmodi, sed etiā circa margines atq; oras fluminum sua sponte adnascuntur, quādo nullo alio loco fluminis meminisse nobis li-

cuit : quinetiam iuncos palustres eo in loco describemus , quos & residibus & fluentibus aquis nasci certissimum est. Subsequentur iure ac consequio quodam Arundinetū: in quo permultas calamorum , & huiusmodi platarum species nobis atq; exteris peculiare describemus: verū vt ad opus aliquando aggrediamur à Prato incipiendum est.

PRATORVM DIFFERENTIAE.

ID solum, nō hominibus nostris tantum, sed etiam antiquis magnopere commēdatū fuit, quod minimum agricolæ laborem requireret, vberē tamen ac copiosum fructū domino suo proferret. Summāq; priscorum omnium in hoc spectando fuit, vt fructus is maxime probaretur, qui quam minimo impendio constaturus esset. Quapropter Cato aliquādo interrogatus, quānā esset agri certissimus quæstus, respondit, si bene pascat: quis proximus, si mediocriter. Nullus autem ager melius pascit dominum suū, atq; pratum , vnde aiunt Varro lib. 1. de re rust. cap. 7. & item Plinius lib. 18. capi. 5. prætā antiquis parata dicta fuisse. Et Columella, necessarium eius agri cultum esse dixit, cui veteres Romani primas in agricolatione partes tribuerūt: nomen quoq; indiderūt, ab eo quod protinus esset paratū, nec magnum laborem desideraret.

Pratorum alia sunt irrigua, alia siccanæ appellata. Rigua vel irrigua prata sunt, quæ riuo influenti irrigantur, & tanq̃ suis naturalibus aquis, humoris pabulo saginātur: quod necessarium est, cum id macies terræ ex postulat: quemadmodum si in densa & resoluta humo, atq; exili, prata facias, ea quidem erunt optima, cum facultas irrigandi dabitur: quod certe fit, siquādo palus aut lacus aut flumen aliqua parte subsidens, restagnat in pratum: deriuatur autē aqua per sulcos, vndecunq; pratum prætercurrentes, quod humor superueniens lentē prorepat, nec abundantius q̃ par sit fluat. Aquarum enim abundantia, æque atq; penuria (inquit Columella) graminibus est exitio. quapropter antiqui riuos pratorum irriguorum ita deducebant, ut quando liberet occluderent: referarent autē, quando cūq; esset maximē necessarium. Hinc illud Virgilij: Claudite iam riuos pueri, sat prata bibere.

Siccanæ prata, nullis aquis, præterq̃ imbribus irrigantur, siccitate soli gaudent, & absq; riuui deductione suapte natura fœnum optimum gignunt, læto enim pinguiq; campo, non desyderatur influens riuus: meliùsq; habetur fœnum quod suapte natura succoso gignitur solo, q̃ quod irrigatum aquis elicatur. Siccitas autem ea, referenda est ad exteriorem soli superficiē, potius q̃ ad ipsum terræ corpus internum, quod certe absq; natu-

rali qui subest humore fœnū optimū (quod humido præcipue nutritur) generare vix posset : alioqui soli siccitas herbis omnibus fœcilibus est inimica. Succosum id solum Columellæ dictum esse puto, quod intus præhumidum, naturali & insita quadam humiditate nutritur, vt aduentitia, præterq̃ cælesti, non indigeat. Atq; ea quidē humiditas naturalis, ab aqua quæ solo subest aduenit. Nam eo loco si paulo altius terram effodias, maximam vim aquarum subesse cōperies. Quod facile indicant, & accliuus quæ plurimum esse debet pratorū positio, aut etiam in imis locis: item vicin⁹ vel saltem parum inde remotus amnis aut lacus, ac præterea herbarum quæ locum humidum desyderant spontina quædam productio, ex qua aquileges aquam subesse facile existimant.

Nouella prata dicuntur Palladio, quæ recēter fiunt, quandocunq; ad id opus destinatur solum, vt fœnum producat. Formanda sunt ea prata, ex eiusdē authoris sententia, Septēbri mense, loco pingui, rosido, plano, leuiter inclinato. quod & noua prata instituere idē ait, principio Nouembris.

Vetera prata idem appellat quæ Plinius senescentia, nempe quæ propter frequentem herbarum productionem, atq; irrigationem, vel sterilescunt, vel muscum contrahunt. fieri enim non potest, vt terra, vno seminis iactu, perpetuum fœtū in multos annos pro-

ferat, interdum enim sterileſcūt prata, interdum fructum non vſque adeo vberem proferunt: quod vel carie, vel incuria, vel vetuſtate accidere ſolet.

Prata ſummiſſa vocat Varro, quę in accliu loco ſita ſunt, quemadmodum Virgilius arida, in quibus herba per æſtus exaruit, quo tempore tondenda ſunt, ac ſubſecanda falci- bus: verum de culturæ vocabulis nunc eſt paucis dicendum.

VOCABVLA AD PRATORVM CVL-
TVRAM PERTINENTIA.

EXtirpandum atq; impedimentis omnibus liberandum agrū quē in pratum deſtinauerimus docet Palladius lib. 2. in Septembri, ante quē proſcindatur, aut exaretur: hoc autem fit, dū herbas latiores & ſolidas, atq; adeo virgulta ex agro deponimus, quæ alioq; vel aratro vel vāga aut bidēte difficili- lime auferrent: vulgus noſtrū vocat *eſſarter*.

Dilapidandum quoq; agrum ad pratū no- uellum deſtinatum docuerūt antiqui agrico- lā: hoc eſt ſubmouendos atq; egerendos eſſe lapides omnes, tum maiores, tum etiam mi- nores, qui arationi & proſciſſioni ſoli pluri- mum nocere poſſint: Id vero agricolationis genus quidam vulgo vocant, *eſperrer*.

Proſcindere locū, quem prato dicauerim⁹ æſtate oportere iubet Columella: hoc eſt ter-

ram esse vertendam atque excolendam: siue aratro siue bidente id fiat: quò semen facilius suscipiat. Terra autem cum primum aratur, tum proscindi dicitur (inquit Varro lib. primo) quod vulgus nostrum ait, *labourer*, si id quidem aratro fiat: si autem bidente, *houer de premiere facon*.

Subigendum post proscissionē pratum præcipiunt omnes agricolæ: cum post primam arationē, relictæ glebæ, vel occantur, vel confringuntur: quæ duo postrema vocabula ad eius agri qui suis temporibus diuersam arationis culturam requirit maxime pertinent. Vnde terram subigere fissione glebarum elegantissime dixit Cic. secundo de natura deorum. Exercitandum agrum & multa aratione resoluendum docet Palladius, anteq̃ fœcili semine inspergamus: quod sit submotis (inquit) lapidibus, & glebis ubiq; confractis.

Macrioribus & aridioribus locis, atq; exili terra, si vicina sint riuis prata: tamen interdum stercoreari debent, & asperso recenti lætamine saturari (ait Palladius) vulgus nostrum fumare vocat: quod vt apud antiquos fieri solebat, ita etiam apud nos fieri quotidie videmus, ac præsertim siccaneis pratis & Februario mense. stercore enim, quasi pabulo gliscit exilis terra, inquit Columella. disponitur autem stercus in acervos, qui vno aut altero postea die, disijciuntur, inarantur, & terræ obruuntur, ne solis habitu vires amittat, & vt

permixta humus, prædicto alimēto pinguescat. Quinetiam si prata sint in accliu aut plano iuxta collem, iubent antiqui agricolæ celsiora loca stercoreari. Nam æditior cliuus præbet subiectis alimentum, cum superueniens imber, aut manu riuus productus succū stercoreis in inferiorem partem secum trahit. quapropter agricolæ etiam inaratum collē magis q̄ vallem stercoreant. Verum à superiore prati parte fundendus est fimus (ait Pallas) ut eius succus per totum possit elabi.

Serere pratum nouellum omnibus agricolis in usu est, quum terram ad pratum idoneā post primam aut secundam culturam semine ex fœnilibus desumpto inspergimus, interdum viciam & medicam fœni seminibus permiscentes: nonnunq̄, ex Columellæ & Plinij præcepto, per autumnum rapis vel naps, vel etiam faba conferentes, & insequēte anno frumento, tertio autem post diligentem arationem, semen vel florem ex fœnilibus conferentes, atq; ex præsepibus fœno delapsū spargentes.

Post sationem ferro tangi pratum non debet, itaq; cratire oportet (inquit Plinius) quod interpretatur Columella, inducta crate coarctare, ad dissipandos grumos, quos ad versurā plerunque tractæ faciunt crates, ut necubi ferramentum fœnifecæ possint offendere. Crates autem vocamus *des herces*, vnde etiā cratire *bercer*.

Sarrire ad pabula in solo disposita conuenit quæ interdum quidem in prato, plerumque autem seorsum aliorum leguminum ritu multo diligentius excoluntur: vt quemadmodum legumina nobis, ita etiam exculta pabula armentis & reliquis animantibus enutriendis obseruire possint. Nam ligneis sarculis aut rastris, quæ nostri vulgo vocant *ratteaulx ou sarclet*, sarriebatur, vnde id opus vulgo dictum *ratteler ou sarcler*. Ob id autem pratis minus conuenire videbatur sarritio, quod minora sint iterualla, quæ vt arator sarculo vel raistro vndecunq; contingere possit. Pabula autem (quemadmodum erant, medica, vitia, farago ordeacea, fœnungræcum, eruum, cicer, & huiusmodi) in morem horti disponebantur, vti docet Columella lib. 2. cap. 11. areis tantum latis pedum denum, lōgis quinquagenum: vt per semitas & aqua ministrari posset, & sarculū aut rastrū vndecunq; circūagi.

Rigare pratum est, vel clepsydris (quod ad pabula diligenter exculta potissimum pertinebat) vel riuis per loca pratorum varia deductis lætiora facere, & succrescentibus herbis pabulum atq; alimentum præbere. Nam id agricolis est peculiare, vt riuos quos per prata deducunt, interdum sensim protrahant, interdum remorentur, neq; perpetuo effluere sinant: nonnunquam etiam per vniuersum pratū effluere permittant. Rigari autem pratū non debet (ait Palladius) antequam durum solū fecerit

ne cratem eius minus solidam, vis interflui corrumpat humoris: post primā autem prætī sectionem, id vsque adeo diligenter non est obseruandum.

Purganda esse prata docet Palladius Ianuarij & Martij initio. quo vocabulo intelligendum puto esse vindicanda ab ijs herbis, quæ præter sementem positam succrescunt, neque pascuis sunt commodæ, veluti si post improbe exherbatum aut subactum id solū quod prato dicauerimus, aut etiam stercoreis vitio, noxiæ quædam herbæ succrescant, quæ quidem (nouellis præsertim prætīs) sunt auferendæ, siue id runcatione, siue auulsione fiat. Solo enim male exherbato aut subacto, solent aut gramē, aut carduus, aut latiores herbæ, aut etiam virgulta succrescere: lætaminis vitio, nascuntur vrticæ, atque id genus herbę inutiles.

Pascere pratum translatione pereleganti dixit Plinius, lib. 18. cap. 28. pro eo quod est armenta vel pecora immittere prætīs ad herbas depascendas, quæ ipsis quidem adhuc teneris & subsidentibus mittenda non sunt, ex Columellæ sentētia. Nā pecudes (inquit) molli solo infigunt vngulas, atq; interruptas non sinunt herbarum radices serpere, & condensare. Secundo tamen anno, minora pecora post fœnifecia permittemus admitti, si modo siccitas & conditio loci patietur. Tertio deinde cum pratum solidius ac durius erit,

poterit etiam maiores recipere pecudes. Nō enim debent prata quę læto sunt, vel humido loco pasci, ante secūda fœnificia, ne herbae vellantur, obtritūq; hebetentur.

Secantur prata cum spica deflorescere cœperit atq; roborari (ait Plinius) secandāque sūt anteq̃ inarescant : nam & largius fœnū percipitur, & iucūdiorem cibum pecudibus præbet. falcare vulgus nostrū corrupte profert, *faulcher*. Cædere & defecare eidem authori etiam dicuntur. Prata (inquit) circa calendas Iunij cæduntur. Idem defecta prata rursus ait rigari oportere, vt secetur autumnale fœnum. Subsecare dixit Varro. Cū (inquit) herba crescere desijt, & æstibus inarescit, subsecari falcibus debent. Virgilius per eleganti translatione, tondere protulit, Nocte (inquit) arida prata Tondentur.

Quoties prata defecta sunt, oportet sicilire, hoc est, quæ fœnifices præterierāt secare, vulgus nostrum recurrere, aut refalcare dicit. Siciliēda (inquit Varro) prata, hoc est falcibus confectanda, quæ fœnificæ præterierunt, ac quasi barba tuberosum reddiderunt campum, à qua sectione arbitror dictum, sicilire pratum.

Restituere pratum, est senescens instaurare, ac denuo subigere atq; serere. Restitū prata debent (ait Plinius) faba in his sata, vel rapis, vel naxis, vel milio, mox insequēte anno frumento, rursūq; in prata tertio relinqui.

B.j.

P R A T V M.

Ac quoniã de pratorum culturæ vocabulis,abunde dictũ esse videtur, nunc de fœni & falcium ratione paucula quædam describenda sunt.

F O E N V M.



FOEnum ob id dictũ fuisse quòd multo fœnore dño suo quotannis proueniat, omnes norunt, vel quòd eadem perpetuo manentes herbæ, quotidie nouæ fiant:ex Festi interpretatione.

Optimum fœnum est Catoni quod prima sectione colligitur, vel primo quod vocant fœnifecio. Secunda autem eiusdem anni sectione quod reconditur,id cordum & autumnale fœnũ appellabant antiqui:vulgus nostrum vocat, *regaing*. defecta prata (ait Plinius) rursus rigare oportet,vt secetur autumnale fœnũ,quod vocant cordum.Sero natum fœnum appellat Columella.

Fœnifecia dicebantur,fœni sectiones,quæ admodum vindemiæ vuarum: vnde prima & secunda fœnifecia fecit Varro. Columella fœnifecia maluit proferre.Secũdo, inquit, anno minora pecora post fœnifecia permittemus admitti.

Fœnifex Plinio, is est quem falcatorẽ vulgo dicim⁹. Apud antiquos (inquit) cornu ad crus ligato fœnifex incedebat, fœnifecã ma-

luit dicere Varro. Herba (inquit) in pratis ad spem fœnifecæ nata. Persius, Fœnifeces crasso vitiarunt vngvine pultes. fœnifectorem appellauit Columella lib. II. cap. I. quemadmodum & arboratorem & vinitorem eodem loco.

Fœnilia quemadmodum & palearia, dicuntur antiquis agricolis; tecta, in villa aut domo rustica, sub quibus fœnum & paleæ reponi solent, atq; asseruari. Pars domus rusticæ fructuaria ait Columella lib. I. ca. 6. diuidat in cellâ oleariâ, torculariâ, cellâ vinariâ, de frutariam, fœnilia, paleariâq; quidam ex vulgo nostro fœnaria vocant. Tabulatum appellant Varro, & Columella multis locis. inde reponere fœnum in tabulato apud eosdem frequenter reperies.

Fœnum falcibus subsecatur apud nos, quemadmodum & apud antiquos: sed & falces quibus prata desecantur, vocat Cato fœnarias, ad aliarum differetiam quas stramentarias appellat, ad frumenta desecanda idoneas, & arborarias, ad purgationes arborum dicatas, sic etiam vineaticas, & syluaticas, & rusticarias nominat.

Falcium autem fœnariarum duo genera recenset Plinius: Italum, quod fuisse breuius ait, ac vel inter vepres quoq; tractabile. Sunt & Galliarum latifundia, maioris cõpeditij, quippe medias cædunt herbas, breuiorésq; prætereunt. desecabant autem fœnum Itali, vna

tantum manu dextra , vt recenset idem auctor. Quinetiam antiquiores oleo falcis aciē excitare solebant, quapropter cornu ad crus ligato, fœnifex incedebat. Italia aquarias cotes dedit , limæ vice imperantes ferro. Quidam ex nostris lima vti malunt.

Fœnum defectum, vertitur ad solem, vt sic cetur, & perarescat . id autē furcillis esse faciendū docet Varro cap. 49. lib. I. Vt perarescat (inquit) fœnum, posteaquā defectum fuerit, furcillis versari debet; ac superiore parte sole siccata, tumdemum conuertendum, itaq; efficiemus vt vndecunq; siccescat.

Fœnum vbi peraruit, in manipulos cogen dum esse præcipiunt omnes agricolæ, vt ad villam conuehatur. id autem est quod vulgus nostrum appellat, *botteler*. Nam in cumulos aut acervos fœnum siccū oportet prius cōstruere, vel etiam in metas extruere, quas in angustissimos vertices exacuebant: has autem, molas vulgus nostrum appellat, deinde vero ex metis, manipuli sunt efficiendi, aut (vt ait Columella) vinciendi potius, vt in villam fœnum facilius deportetur.

Fœno in cumulos redactō, stipula rastellis eradenda est, ex Varronis præcepto, atq; addēdus fœnifecæ cumulus. Inde vero quod optimum fœnum erit, Cato iubet seorsum esse condendum, & sub tecto in fœnili componendum, quod non ante fieri debet, q̄ per paucos dies in prato cōgestum relinquatur,

vt in se cōcoquatur & facile deferuescat in molis, ac cumulis. Rastella autem vulgus nostrū appellat, *des ratteaulx*, quēadmodū & rastellis fœnū colligere, *ratteler*, quod alioqui rastellare quā diceret. Nūc ad pratēses herbas.

PABVLA, IN PRATIS CONS-
SERI SOLITA.



Vando in eum vsū pręcipue instituta erant prata, vt animarū libus pabulum subministrarent, ob idq; varijs feminibus ad pabulum iumentorum admodum vtilibus conserebantur: necessarium est, vt de his etiā hoc loco dicamus, etsi in agrū quędam differri possint. Nam & vitia, & medica, & fœnum gręcū (quas pratenſes herbas esse hodie nouimus) antiquis summa diligentia colebantur, atque à prato interdum summouebantur, vt in agrum seorsim deponerentur, haberētq; culturam sibi propriam. Nos autem nullo discrimine deponimus huiusmodi semina nostris pratis, quę nos inducit ratio, vt primum de his dicamus.

Inter pabula igitur quę offeruntur equis: nostrum vulgus id maxime probat quod fit lenticula & vitia simul commixtis, ocymum antiqui vocabant: nos dragetam equorum appellamus. quod qua ratione differat ab ocymio quod basilicum vocant, in horto sa-

tis iam est explicatum . Varronis tempore, bobus ocymum præbatur, ad aluum ciendam, vnde sic dictū cōtendit: atq; id genus pabuli esse asserit, virides segetes defectas, antequam siliquam gerant : q̄q̄ Cato manibus carpendū ocymum iubeat, nam (inquit) si falcula refecueris, non renascetur, atq; eos usque dādum bobus, dum inarescat. Plinius ocymum antiquos appellasse tradit, pabulū vmbraē patiens, quod celerrime proueniat.

Pabuli aliud genus est, quod farrago dicitur, nostris vulgo, *fourraige*. Id autē est quod ex pluribus satis, pabuli causa datur iumentis, nempe segetum viridium & immaturarum defectum, antequam in spicā assurgant: quibus additur, hordeum, vicia, & legumina, pabuli causa. Inde autem dicta farrago, quòd far ferro cædatur, aut quòd primum in farracia segete seri cœptū. Ea equi, ac iumenta verno tempore purgantur, atque etiam saginantur. Duplex autem fuit antiquis farrago, nempe quæ ex recrementis farris, admista nonnunquam vicia sereretur, nonnunquā ex hordeo, quæ hordeacea farrago dici solita est. hanc esse putat Ruellius, quam græci vocant *grastim*: & multi non indocte semiaridum fœnum interpretantur.

Pabulorum nullum est quod ad iumenta saginanda æquè faciat atq; medica, vulgus nostrum fœnum sanctum vocat, quòd veluti diuino quodā numine ad nos peruenerit.

opinor autem ob id medicā antiquis dictā, quòd medeatur iumentis, & pecori macie laboranti : vnde villici ac pecorum magistri apud nos vtuntur tota hac herba in pabulo pro gramine, nam ad maciem pecorum & veterinorum, nulla res est quæ tātum faciat quantum medica : præsertim si viridis, nunc tarde tamen arida præbeatur, atque id modice, ne nimio sanguine stranguletur pecus. Sūt qui Burgundienſe fœnum appellēt, quòd à Burgūdionibus allatum ad nos peruenit, alij fœnaciā vulgo vocant, *de la foignasse*, sermone Picardo, nonnullis ex nostris magis placet magnum trifolium appellare, quòd ea similis sit caule & folijs trifolio in fœniceſis & pabularibus prouenienti: geniculata, vt quicquid aſſurgat in caule contrahatur in folia . In ſcaporum cacumine breues ſiliquulę prodeunt, in corniculorum ſpeciem intortæ, denticulato foris influxu, & velut exiguos mucrones exerente, in quibus ſingulare ſemen, ferè lunatum continetur, lentis magnitudine, folliculo cohærens, quod dentibus freſum, piſi ſaporem repræſentat, ori nō ingratum. ſingulæ thecæ ſingulorum ſeminum ſunt capaces, quapropter condimentario ſali permiscebatur.

Inter fœni genera Plinius cōnumerat herbam quæ odontides græcis dicitur, naſciturq; in pratis, vbi & fœnum, vnde fœnariā vulgo vocāt, *de la foignere*: frutiçoſa eſt, triā

gulis flagellis, geniculatis, nigro articulorū nodo, folijs polygono longioribus, hordei semine (quod in alarum sinu erumpit) flore purpureo, multifido.

Pabuli causa serebatur antiquis fœnū græcum appellatum, Varroni siliquula, rusticis antiquis & Plinio siliqua, vulgo nostro, *sene gre*, corrupta dictione: Theophrasto buceras, Hippocrati epiceras, quòd fructum corniculis similem gerat. Cauliculis emicat exilibus, folio penè trifolij, semine fuluo, incondito, quod in mollissimam tunditur farinam: serebatur antiquis seorsum, nō altiore quatuor digitorum sulco, vt iugerū agri modios sex seminis reciperet, duobusq; anni temporibus serebatur, ad Septembrem & Ianuarius. Nostris agricolis non ita diligenter tractatur, sed in prato negligenter deponitur, cū vel ex antiquorum sententia, quanto peius tractetur, tanto proueniat latius.

Vitia, omnibus nota iumentorum pabulo: ea antiquis serebatur, & nostris quoq; hodie feritur ob duplicem vtilitatem: nam & pabulum veterinis præbet, & terram fermētat ac stercoreat, solum in quo iniicitur latius redens. Iniicitur etiam pratis vnā cum supradictis seminibus, quo fœnum sit nobilius & salubrius: vnde fœnum viciæ, & vicialia vocat Columella. dictam appellat Varro viciā à vinciendo, quòd suis clauiculis sese vinciat atque alliget alijs herbis, aut pedamentis vis

cinis. Galenus vicij vocabulū in pleraq; Græcia vſitatiffimum eſſe teſtatur, noſtri Latina imitatione vocant, *de la ueſſe*. omnibus nota eſt: cubitali aīritudine, folijs ferè petroſelini, ſed amplioribus, flore piſi, minutis nigricantibúſque in ſiliqua granis. Seritur in quacunque terra, facillimo cultu. Optimum bubus cibum præbet.

Viciaginem vel viciolam vulgus noſtrum appellat herbam quæ triticum ſtrangulat, & tamen habet neſcio quid ſimile cum vicia, vnde vocatur, *ueſſeron*. ſemē gerit columbis amiciffimum, vt quidam eò ſerant huiuſmodi viciaginem, vt columborum multitudinē in ſua prædia alliciant. Ruellius quiddam ſimile habere contendit cum cracca Plinij, & araca Galeni. Plura in agro, cum de lolio ſermo erit.

Viciam agreſtem, noſtra rura vulgo appellant eam herbam quæ aphace Græcis dicitur, ſimili enim omnino habitu cum vicia in agris conſpicitur: non eſſe tamen veram viciam contendit Ruellius, cum in agris nō proueniat niſi cultu diligenti, & magno labore. florem eius ruſtici intorquent coronis, quoniam perpulcher emicet, cum odoris ſua uitate: alioqui veram viciam *βίτιον* Græci vocant: de qua plura in agro.

Cicerculam Columella inter pabuli genera annumerat, eam proximam ſœnogræco & medicę tradens. ſarras vulgus noſtrum vo-

cat. Ea enim bubus erui loco datur : pīso similis est, sed non vsqueadeo grata, quę ligata in fasciculos vnā cum vicia optimum præbet bobus alimentū. antiqui curiose ferebāt cicerculam , de qua in agro plura dicemus. quemadmodum & de eruo & eruilia, quo loco de leguminibus fiet à nobis mentio , ad reliquas herbas veniēdum, quæ pabulum nō vsqueadeo optimum præbent.

H E R B A E P R A T E N S E S.



Tiliores herbas descripsimus, quibus prata plerunq; abundāt, quæq; pecori, delicatioris cuiusdam pabuli loco esse solent: reliquæ mox describendæ, quæ non ita sunt vtilēs, quibus tamen ipsa prata plurimum hincinde referta esse videmus.

Sī quæ igitur herba pratis est familiaris ac frequens, ea est maxime quam à coniunctorum inter se foliorum numero, trifolium, tum Græci tum etiam Latini dixerunt: quæ ut est multiplex, ita etiam insigni ac peculiari quadam denominatione, ea quæ in pratis est, trifolij pratensis nomē obtinuit: quæ quidem cū reliquis minor esse soleat, tamen pro foli pinguitudine, paulo maius folium ostendit, subalbida quadam in medio folio macula conspicuum, quo nomine rusticis puellis ad coronamenta in vsu est, id menyantes

Græci vocant . Cuius eam vim esse tradunt quidā, vt futuram tempestatem prænunciet, & contra arrigatur: expertūmq; esse aiunt, si quando album trifoliū abunde floruerit, sequenti anno futuras esse aquarum inundationes. Cæterum quod altius est trifoliū, id virgis tenuibus fruticat, nigris, ac iunceis, cubito interdum altioribus, in singula germina folijs exeuntibus, flore purpureo, semine lato, & quadamtenus piloso: radice oblonga, alba, paulo graciliore ac firma. At quod minus trifolium dicitur, id terræ magis vicinum est, vno tantum cauliculo assurgens, ternis etiam folijs, orbiculatis, ijsq; folijs, erucam subolētibus, quapropter solum id vulgo nostro trifolij appellationem obtinuit: atq; id etiam aiunt recentibus vulneribus contusum probe mederi.

Simoniacum trifolium Columellæ, inuenitur in fragosis locis, quod quia odorem grauem ceu bituminis refert, ob id asphaltion Græcis appellatum est: asphaltian vocauit Archigenes. Longis & hirsutis viret folijs, caulēmq; gerit pratēsi trifolio robustiorem.

Trifolium acutū inquit Scriboni⁹ Græcos oxytriphylon vocare, idque ait Siciliae montes circundare, neque se in Italiae regionibus usq; vidisse, nisi in Lunæ portu, cum Britannia peteret, cum Claudio Cæsare. Est autē folijs & specie communi trifolio similis, nisi quod paulo pleniora sunt, superiori parte aliquan-

tulum lanuginosa, atq; in extremo quodammodo aculeata: sed frutex huius duum pedū interdum altior est, atq; odoris grauis: quorū nihil tale in pratensi trifolio conspicitur.

Oxys (vt est Plinius author) folia terna gerit. Ea putatur oxytriphylon. non quidē ab acumine foliorum, sed ab acido gustu poti⁹ dictum. est enim trifolio simile, longis tantū pediculis, tria summatis folia proferentibus acido sapore, flore luteo, nonnunq̃ candido, in simplici stilo inter folia profiliante, rufo in lunatis siliquis foetu, radice in trāsuersum longa, & fruticosa, vulgus panem cuculi appellat, officinē trifoliū acetosum, & alleluya.

Tria apud nos (inquit Ruellius) inueniuntur trifolij genera, vnum bicubitale, ramis exilibus, trigeminis, per interualla folijs nigricantibus, quę dum pubescūt, rutaceo sunt odore, vbi adoleuerūt asphalthis, flore purpureo, semine fœnugræci, radice oblonga. Alterum omnibus notum, folio molli, rotūdo, lente maculoso. Tertium acuto folio addūt, & quartum nostri herbarij, quod acidum nomināt trifoliū, vulgus panis cuculi & alleluya: vt paulo ante dictū est, id autē humile est, longis tamen pediculis, acetoso sapore, flore candido, rufo in lunatis siliquis foetu, radice in transuersum longa ac fruticosa.

Trifolium maius vocarunt Latini quem Cytisum, & triphylon etiam Græci, qui frutex est incanus totus, agris ac collibus famis

liaris. Ob id autem trifolij nomen obtinuit, quòd & tria in singulis germinibus folia gerat, ea tamen paruula, dorso in medijs rubēte, vt erucæ odorē referant si digitis terātur.

Trifolium minus à Romanis appellatum, quod & libyon & triphyllon etiam Græci vocarūt. Lotum syluestrem esse certum est, generatúrque in scenilib⁹ pratis, semine scenis græci minutiore multo, medicati gustus, caule duorum cubitorum, aut etiam altiore, alis pluribus, concauo, ternisque circum ipsas folijs, satis exilibus.

Trifolij pratensis folio est lotus vrbana, quam ob id Græci triphyllon appellarunt: eaq; nascitur in pratis nostratibus, luteis floribus veluti pisi, sed multo minoribus, cauliculum superne coronantibus: humilis, palmi altitudine, officinæ andacochan & coronam regiam vocant. An ea sit quam tātò opere extollit Homer⁹, græciq; omnes, quæ nisi post annum è semine suo nata, sitim arceat, vescentibusque cibi ac potus loco esse soleat, hoc vero nobis incertum est, nihil vt de hac re certi aut statim proferre possimus.

Trifolium odoratum à Romanis etiam dictum quod Græci Medion appellarunt. nascitur ea herba in opacis saxis, folia habens seridis, trina quidē in singulis geniculis, caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum, semine minuto, ad imaginem cnici, radice semipedali, crassitus

dine baculi, austeram gustui.

Caueto autem ne pro trifolio tripolion proferas, habent enim ea duo vocabula non nihil inter se vicinum: verum tripolion nascitur in maritimis, ubi allidit vnda, interimque retro comeat: Folia habet isatidis, arida sed crassiora, caulem palmo altum, in mucrone diuisum, huius flores tradunt ter in die mutari, candidos mane, purpureos meridie, puniceos sole occidente conspici: cæterum radice est alba, odorata, calidi gustus.

Trifolium aliud est ex satyrii generibus, ita appellatum à foliorum numero: satyrium autem dictum, quod eius radix venerè stimulet, nam herbas propè omnes venerè stimulantes Græci satyrii voce cognominarunt. Ea herba in nostratibus pratis interdum nascitur, & tria humi folia spargit, rumici vel lilio similia: caulem gerit læuem, cubitalem, nudum: florem albo lilio similem, radicem geminorum bulborum, exterius rufam, intus candidam, corticem radicis gracilem, intus album quidam continentem quod sapore sit dulci, gustantibus iucundo: rura nostra eam herbam testiculum sacerdotis appellarunt.

Verum quando in satyrii mentionem incidimus, æquum est ut eius genera ac differentias paucis hic perstringam, etsi de hoc non nihil iam in sylua à nobis dictum fuerit:

Satyriorum genera, testiculorum nomen habent, quos Græci orchies appellarunt, ob

id potissimum, quòd earum herbarum radices, quiddam cum testiculis habere simile videantur. vt igitur ea genera facile pernoscas hæc perdiscito. Orchis serapias folijs est porri, oblongis, latioribus, pinguioribus, ex alarū sinu emicantibus & inflexis, caule palmeo, flore purpureo, radice testiculis simili: quorum alter flaccidus quodammodo appareat, alter ad inferiora inæquali quadam productione vergat. Quibusdam autem huius generis plantulis testiculorum loco radix, veluti manus cuiusdā expansę figuram gerit, qua propter vulgo man⁹ Christi appellata. Alijs vero cū radix sit testiculis similis, folia itē reliquis similia, florē tamē gerunt variū, nempe ex albo nigricantem, spicatum tamen omnes. Quinetiā inter eas quæ purpureo sunt flore, quædam flosculos habent in spica magis congestos, nihil odorantes, aliæ magis secretos, neq; ita numerosos, caryophyllō ipso odore referētes, cætera satyrio similes: Verū is odor cōfestim deperit: Sūt qui ob id quòd ita spiret, sitq; colore purpureo & suaue rubēti, hyacinthum esse contendunt: dicantq; nescio quid ad Dioscoridis descriptionē conuenire: cui sententiæ nullum addiderim calculum. Itaq; satius fortasse fuerit id genus satyrion odoratum appellare.

Satyrium minus, & testiculum canis vocāt vulgo, herbam eam quā Græci cynosorchin appellarunt, quàmque in vineo iam antea

descripsimus. Ea est folijs paruis, ternis (vnde etiam trifolium dici potest) semipedalibus, radice formam testium canis referēte, alternis annis intumescēte, ac residente.

Satyrion indicum, bucheiden Syri vocant, herbam apud eos frequentē, radice candida ac dura, cōmēdatiore quo crassior, rugosior, atq; albior fuerit: cuius effectum talem esse aiunt qualē eius herbæ, quam ait Theophrastus concitare venerem vsque ad septuagesimum coitum.

Satyrion erythrococcon Plinio, semine est viticis, paulo tamen maiore, læui, dura radice, cortice rubro, intus album quiddā includente, sapore subdulci. radix ipso contactu venerem stimulat, magis autem si epota fuerit. Atq; hæc de satyrio quæ in hanc sententiam adferre potuimus.

Nostris pratis quemadmodum & alijs locis præhumidis, quibus aquam subesse iudicamus, frequētissimus est ranunculus, qui Græcis batrachion appellatur, ab eo quod ranæ in pratis aut locis riguis insultantes sese super hac herba frequentissime conuolunt: quapropter etiam quibusdam apium ranarū appellatur, alijs strumea, quòd experimento compertum fuerit, eam herbam strumis mederi, præsertim equorum, id enim veterinarij nostri quotidie satis experiuntur. nonnulli ex vulgo nostro à florum similitudine bacinnulos vocant, habent enim nescio quid simi-

lem cum ijs vasis quibus tonfores barbas loturi, aquam aut lixiuium excipiūt. Sunt etiā num aliqui qui à foliorum serie atq; incisura pedem coruinum nominarunt. Apium autem non sine ratione vocatum est, tum nostratibus, tum etiam veteribus: habet enim folia ad apium accedentia. quamobrem etiā ea ranunculi venenata species, in Sardinia (vnde Sardoia Salustio dicta) frequens, quæq; cœnosis locis iuxta aquas apud nos crescit, apium risus appellatum est, alijs apiastrum, quasi sylvestre apiū dixerint. hæc ora hominū, ac rictus cū dolore contrahit, vt quasi ridentes interimat. vnde prouerbium: Sardonijs risus. Apium rusticum quidam vocant apud nos: lanuginosis est aliquātulum folijs, fœtidis, apium subolētibus, gustu acerrimis, caule alto, femine, ac flore veluti cuiusdam apij: radice capillata, cœno delibuta dum extrahitur, in defluuijs fontanis prouenit, aut aquis quiescentibus ac cœnosis. Ea vtuntur veterinarij nostri ad scabiem equorum medicandam.

Complura ranūculorū gñā statuit Dioscorides, quibus oībus vim acrē & exulceratoriā inesse censet. Nos verò, vnam tantū speciem nouimus, admodum acrem, & radice potius quàm folijs: licet etiam folia vim habeant causticam. Nam quæ flore simplici atque aureo in pratis nostratibus frequens conspicitur, caule gracili, cubitum alto, radice parua,

C. j.

amara, candida, multis capillamentis fibrata, ea certe vim vsque adeo exulceratoriam non habet, aut paruam admodum: qua carpo adalligata, vtuntur nostræ matronæ ad febrem (vt aiunt) abigendam. Quæ verò polyanthemus græcis dicitur, eā vulgus nostrū bacinus los duplices vocat, autumnóq; præsertim cōspici solet: reliquis anni temporibus non itē, aut saltē paruula, neq; nascitur in præhumidis pratis, sed siccaneis, folio ac caule breuiore, flore conduplicato, non ita luteo, interdū subrubro, radice bulbosā, candida, quā si quis gustarit acerrimam persentiet. Ea certe vlcerā excitat, folijs quidem contritis, magis autem ipsa radice, quæ vel etiam quinq; linteorum voluminibus implicata, vim suam exerit, vesiculāsq; ac febrē excitat, haud minore ardore, q̄ si fimo colūbino aut fæce vini vsta cauterium alicui corporis parti admoueres. Ea est qua sanguine draconis macerata, suras aut femora illinere solēt nebulones quidam mendici, quo facilius nobis imponant, quapropter nonnullis herbarijs vlceraria ac scelerata solet appellari.

Sanicula vulgo dicta, ranunculi species est, ita enim & folio & flore esse deprehenditur, tantum ipsa radice dissidet, quæ oblongior est, & quodammodo nodosā, folia item contrita, myrrhæ suauem odorem spirāt. verum de hac in sylua satis dictum est.

Bellius, siue bellis, aut bellio (sic enim vo-

cat Plinius) flos est pratis admodum peculiaris, quam margaritam vulgus nostrum appellat, herbarij consolidam minimam, quòd dicant recentia vulnera, eius herbæ admotu consolidari. Duorum est generum, maioris & minoris discrimine insignium. Minor, flore est albo, aliquatenus rubente, nempe in summo, quinquagenisquinis barbulis pastillicatibus coronato (inquit Plinius) quanquagenas ternas non quinas Barbarus dicat se inuenisse: folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblongo, leuissime serrato, sylvestris floris calyculis, simplici foliorum ambitu, emaculato candore.

Maior belius, pcerior asurgit folio, à prior non admodum diuerso, altioribus tantum crenaturis laciniato, cauliculis tenuibus, surculosis, cubitum altis, flore priori non dissimili, paulò tamen maiore: paucioribus tantum barbulis, medium luteum in orbem concinnè cingentibus (ait Ruellius) rura nostra grandem margaretam vocant, herbarij consolidam mediam.

Odontides, fruticosa herba: dicta græcis, quòd dentibus medeatur, vulgus nostrum fœnariam vocat: prouenit vbi & fœnū, triangulis flagellis, geniculatis, nigro articulorum nodo, folijs polygono longioribus, hordei semine ab alarum sinu erumpente. Nihil hac herba frequentius in pratis, flore est purpureo, pusillo, multifido, tumētibus in caule ar-

ticulorum nodis. Plinius inter fœni genera connumerat.

Dauco Cretico prata siccanæ plerūq; sca-
tent: est autem fœniculi similitudine, mino-
ribus & candidioribus folijs, caule semipeda-
li, capitibus rotundis, vt coriandri: flore can-
dido, umbellato, in cuius medio semen est
purpureum, quod digitis vulsum ac tritum,
cocci cnidij similitudinem habet, odorēque
atq; adeo ipso contritu nescio quid naribus
refert, quale & granum tinctorium, quo no-
strates pannos omnium delicatissimos infi-
ciunt. Radicem gerit, digitali crassitudine,
longitudine dodrātali, pastinacæ odore re-
ferente: vnde Latinis, gallica pastinaca dici-
tur, vulgo nostro, syluestris carota.

Est & daucus Asininus herbarijs vulgo di-
ctus, pastinacæ non dissimilis, opacante fasti-
gium anethi umbella, semine oblongo, odo-
ratu grani, sapore vt cuminum acri. Tertiū
est aliud dauci genus apio simile, feruēs, acre,
gustanti odoratum. Cæterum qui apud Cre-
tam (quam hodie Candiam appellant) nasci-
tur daucus, is est multo vehementioris odo-
ris, propter regionis calorem, quàm qui apud
nos: cuius umbellæ tenues furculi, duriores
sunt ac robustiores, qui desiccati vnà cum ip-
sa umbella, ac Venetias deportati, vsum den-
tificariorum præbent. Cætera quæ ad pasti-
nacæ descriptionem pertinebāt, in horto ex-
plicata sunt.

Betonicam alteram plerisq; pratis nostris succrescere vidim⁹. Ea est quam Ruellius ait vulgum nostrum detritis duabus literis toni cam appellari tā officinis q̄ herbarijs, ac medicis. Radicem habet rubram, odoratam, folia porracea, stamine quo medium diuidatur puniceo, vel rubente, cum recto calamo triāgula, floribus in vertice purpureis.

Betam pratensem vulgus vocat, quam græci Limonion, Plinius betam syluestrem. Ea betæ similis est, verum tenuioribus & minoribus est folijs, decem, interdū pluribus: caule tenui, recto, altitudine liliorū, pleno seminis rubri, quod gustu linguā astringit. Haud ita frequens est in nostratibus pratis, apud Italos ac Germanos frequentior.

Achilleas syderitis, ab Achille Chironis discipulo inuentore dicta: herba in pratis frequens, quam nos Galli, Chiliophylli græcā nomenclaturam sequuti simul & ipsam foliorum multitudinem, millefolium appellauimus. Est enim fruticosa, scapo in capillamenti modum vtrinq; folioso, longe breuioribus exilioribūsq; quā fœniculi villis: ab imo hirsuta, cubitali altitudine, vertice ex cādido in puniceum vergente flosculorum mixtura. A latinis quibusdam supercilium Veneris dici, refert Dioscorides.

Nascitur quibusdam pratis præsertim riguis herba millefolio nō omnino dissimilis, nisi latioribus esset folijs, eupatorio magis

similibus, longioribus tamen, sed ita incis-
 sis vt eupatorio videmus, paulo magis ad ter-
 ram expansis ramulis, caule non vsque adeo
 procero. Cæterum sursum ac deorsum lanu-
 ginosa est, albicans, argenti figura, vnde vul-
 gus nostrum argentinam & argentariam ap-
 pellauit. Ea quæ sit antiquis, nondum satis
 compertum esse video. Radicem gerit subru-
 bram, qualis est eupatorio, non ita tamẽ pro-
 ceram. Tantum hoc certũ est ex Ruellij ani-
 maduersione, aliam argentinam etiam voca-
 ram (quæ coriandri sit folio, caule rutæ, repe-
 riturq; in campestribus & macerijs) esse Di-
 scoridis thalictron. hæc vero pratensis, minus
 est certe cognita.

Quinquefolia, nostris, *quintefeuille* dicta, græ-
 cis pentaphyllon vel pentadactylon, quod
 totidẽ habeat diuisiones, quot sunt in manu
 digiti, vel pêtatomon, q̃ in quinque diuisa sit,
 vel pentapteron, quod Gaza ex Theophra-
 sto quinquepennam vertit. in riguis pratis
 circa ductus aquarum nascitur: ramulis te-
 nuibus, festucaceis, palmea longitudine, & in
 ijs semen: folijs mentæ, quinis in singulis pe-
 diculis, raro pluribus, in ambitu ferratis: flo-
 re in lutæum languescente, interdum aureo:
 radice subrubra, tereti, veratro nigro crassio-
 re, adde geniculatos quoque surculos. folia si-
 mul iuncta vitiligineæ comæ formam expri-
 mere videntur. Radix vbi inaruit, nigricat, &
 angulosa fit, sed quum effoditur, rubet.

Quæ tormentilla vulgo dicitur, nisi septē non quinq; haberet folia, certe inter pentaphylli genera annumerari posset : verum de hac in sylua fufius dictum est.

Eupatorium, indubie nostra est agrimonia vulgaris, nulla prorsus repugnante nota. inter heptaphyllorum numerum annumerāda est, locisq; humidis nascitur, vt aquilegibus indicium præbeat, eo in loco aquam subesse in quo succrescat. Nascitur in vite, vnà cum pentaphyllo superius descripto, vnāque cum vite extinguitur, ac semen producit, nempe autumno. Cæterum fruticosa est herba, caule singulari, lignoso, nigricante, tenui, hirsuto, cubitali, vel eo maiusculo : cannabinis ex interuallo folijs, quinquefolio similibus, plurifariam interdum incisis, per ambitum serratis, nigricantibus: medio caule semen erumpit pilosum, deorsum spectans, quod resiccatum vestibus adhærescit.

Hippuris, equisetum dicta Plinio, nostris equina cauda : in riguis pratis inuenitur, admodum inuisa fœnifecis propter asperitatē. Recto caule profilit, cubitali, & interdū amplius, inani: comis per interualla ac geniculos propendentibus, breuiusculis, mollioribus & candidioribus. Lugdunensibus pratis profilit incomata, geniculis tātum scabris, ac iuncis. Ea herba mulierculæ stanneam suspellectilem tam escariam quàm etiam portoriam elegantissime perpoliunt: haud igno-

ta fabris materiarijs dum lignea pectinum & aliorum minorum operum ruditatem, huius herbae scabritia in nitorem expoliunt. prellam vulgus Lugdunense vocant.

Autumni exitu florem ostendit in quibusdam pratis herba colchicon dicta, alijs ephe-
meron, quod temere epota, vno die iugulet:
bulbum agrestem quidam appellant, à folio-
rum similitudine, nostris canineca dicitur,
quod deuorata canes enecet. folia gerit bul-
bi, aliquantulum pinguiora, caulem palmeū,
florem veluti cuiusdam rudimentī naturae li-
lium facere condiscantis, interdum subalbi-
dum, interdum caeruleum: rufum gerit semē,
radicem è nigra foris rufam, quae delibrata
candicat, & mollis spectatur. Lacteo madet
succo, & gustui dulcis persentitur. Bulbo me-
dio rima dehiscit, qua flos erumpit. officinae
hermodactylon vocant.

Galion plerisque pratis nascitur: herba à
græcis sic dicta, quod lacti admota coaguli
loco esse possit, nostris interdum muschetū
minus, modo florabulum appellatur, ab opti-
mo odore, atq; adeo florum multitudine, ra-
mulum foliūque profert aparinae simili-
mum, tenuem tamen, & minorem, rectum:
florem in cacumine luteum, multum, tenuē,
huc atq; illuc per ramulos diuisum, odora-
tum, folia circum caulem aparinae modo
stellatim diuisa. autumno colligitur Galion,
vicatimq; defertur, odoris gratia: cuius florē

nostræ mulierculæ arculis inclusum continent, suis linteolis eo odore imbuendis.

Polygalon ab abundantia lactis quam epota mulieribus tribuit dicta: palmi altitudine in pratis succrescit, lenticulæ folijs, gustu subacerbo.

Osyris, siue osyrias, nostris officinis linaria dicta, à foliorum cum lino similitudine: furculus est niger, ramulos tenues lentosq; gerens, & in ijs folia trina aut quaterna, modo quina, interdum & sena, linum referētia, dein colore mutato subrubra: semine concolori, tantisper dum maturescit, postq̃ ematuruit rubescente, senescentes quoq; ramuli, nigritiem in ruborem vertunt.

Pratensis est quæ Lysimachios aut lysimachia vel lysimachion dicitur, ab inuentore rege Lysimacho, vel à dissoluēda dissidentiū pugna: aiunt enim, boum aut iumentorum discordantium vel calcitronum ceruicibus aut iugo impositam, asperitatem cohibere. respuitur ea odio quodam à bobus, atque adeo omni veterinario pecore, vt solā in aquosis pratis detonsam, intactam relictam videas. vulgus nostrū, præsertim Cenomanense, pelibossam quasi pestifugam appellauit: quòd experimento quodam aliquando comprobatum fuisse dicant, eam herbam paulò altius supra panum pestiferum adalligatam, deorsum pestilēs virus impellere, vt id sursum ad principes partes conscendere non patiatur.

Rustici corneolam vocant. quanq̃ & Manardus & Leoniceus id negent. Hanc herbam infectores nostri quamoptime norunt, quæ utuntur ad inficiendos viridi colore pãnos: eamque cæruleo colori ab Isatide herba iam conciliato superinducunt, ita fit color viridis. Lytron Dioscorides & post eum Plinius appellauit: quod pro liberatione præmiũ importet, sedatæq; discordiæ munus postulet. Vitruuius, luteum maluit appellare, vnde & qui tinctorum non possunt chrysocella, propter raritatem vti, herba quæ luteum appellatur cæruleum inficere solent, atq; ita colore vti viridissimo. Cauliculos emittit cubitales, aut eo paulò maiores, fruticosos, pendens tibus geniculatim folijs, mollibus, tenuibus, fœlicis figura, gustu astringentibus, flore rufo vel aureo: quæ si cõburantur, acrem eructant fumum, naribus offensum, ac mordacem.

Perficaria vulgo dicta, haud parum à Lysimachia differre videtur: sũntq; qui alteram pro altera facile sumant, nisi ad florem, & folia paulo altius aduertant animum, sed hoc præterea est discriminis, quod Lysimachia, duorum aut trium annorum caule perpetuo assurgat: perficaria, singulis annis renascatur. Cæterum vtraq; geniculata est, caule subrubro, ex cuius internodijs folia prodeant. Perficaria, minor est, neq; ita alte assurgit, cuius folia, & floris color, persicæ sunt arboris: etsi florem album quibusdam pratis ostendere

videatur,plerunq; tamen subruber est,ac spicaceus:medio folio,apparet macula nigra,veluti plumbago quædam fusca,vnde quidam existimarunt maiorem persicariam,esse molybdænam,quam plumbaginē vocant:quòd commanducata, atq; oculis deligata, plumbū,quod est vitij genus,auferat. Verūm molybdæna,est folio lapathi,crassā radice atque hispida. Persicaria autem,radicem habet numerosam,caulem geniculatum,nodosum, longum, rubetem:semen exile,lente rufum. Porro ea litura quæ maculæ modo cōscripta est in medio persicariæ folio, primis quidē diebus,herba adhuc paruula, vix apparet: cum autem ad florem accedit,quem estate media profert, tum corniculātis lunæ imaginem referre videtur:Cratægonon quidam esse putarunt,quòd omnes, persicariæ maioris notæ illi suffragari videantur. Quod autem ad saporem attinet:multo quidē lenior est persicariæ quàm cratægoni: præterea natalibus dissidēt. Quòd verò hydropiperi, vulgus vocat, *curaige*, quiddam esse videamus cum persicaria simile: non est tamen propterea affirmandum, persicariam dici debere: minoribus est enim folijs, gustu omnino dissimilibus. Verūm de hoc in fonticulo iā diximus.

De fungis ac boletis nūc dicendū est, quæ admodum in sylua eramus polliciti: vel ea ratione, quòd Horatius dixerit optimā fungis pratensibus esse naturam.



Vngos græci mycetas vocant, nec distinguunt à boletis. Verùm Latini fungorum & boletorum differentias latius patentes, hoc solo discernunt, quòd boleti cæpestres aut pratenses sint (à bolo dicti vt M. Vergilius autumat) ex spuma terræ nati ac concreti, septémq; ad summum dies perdurent : vnde illud Galeni & Pauli Aeginetæ, omnium minus nocētes fungos bolitas esse, ita enim appellarunt quos nostrates campiniones dixere. Fungorum enim naturam ait Plinius lentiores esse, ex arborum veluti pituita quadam concretam, magis perennem, fago, robore, cupressò, fico, ferula & gummiferis nascentem. Horū sunt quidem numerosa genera. Omnia autem cortice, medulla, vena, neruo carent, pediculo admodum æquali: Origo prima è limo est, & acescente succo madentis terræ, aut radicis fermè glandiferæ. Initio spuma lentior: dein corpus mēbrana simile, mox partus.

Pezicæ fungi appellati, quasi sessiles, quibusdam alizæ, propterea quòd nec pediculū nec radicem habent.

Amanitæ dicti fungi, post boletos secundas tenent.

Aegiritæ vero, industriæ fermēto in populi nigra trunco aqua diluto protinus coales-

fcunt. Proinde venenatos fungos solos eos esse Nicander refert in Georgicis, q̄ in olea, granato, ilice, & quercu nascuntur. Tertium genus solis accomodatum venenis: quique in coquendo duriores fiunt. Tutissimi qui rubent callo (ait Plinius) minus diluto quam boletis rubore, mox candidi, velut apice flaminis, insignibus pediculis. Plurimos huius generis Fluentini solent edere, colligunturque ac vanales apud eos proponuntur deliciarum gratia. Nostris tantum in usu boleti pratensis, quos una nocte veluti rore quodam natos videmus.

Fungorum diuersa nomina, quae apud recentiores Italos peculiaria sunt, ita refert Barbarus: Ouatos, ab oui similitudine: Spongiosos, à spōgiæ figura: Digitellos, à digitis: porriginosos, à porrigine. Laciniæ priuatim dicuntur è castanea, magnitudine spectabiles, ut singuli sufficiant.

Prunulos, & spinulos ac cardeolos vocant fungos, qui è rubis cardui sive nascuntur, quos etiam omnium innocentissimos esse volunt quidam.

Agaricum in arboribus nascitur (inquit Plinius) fungi similitudine. Hoc autem venenatim habere ait Dioscorides: praesertim quod nigrum est, atque regione Sarmatarum, quae Syluestris dicitur: unde nomen traxit, nam Agarum & urbem & amnē in Sarmatia vocari tradit Ptolemæus. Est igitur agaricum,

fungi genus , in summis arboribus nascentis , præsertim magnis & glandiferis Gallia, qui noctibus quidem relucet, & candidus est, quapropter in tenebris decerpendus. Fœminam & marē nostræ officinæ constituūt: fœmina, recto est venarum discursu , pectinatim digesto: lævis admodum. Mas rotundus, conuolutior, & concretu spissior. Vtriq; vis cathartica, hoc est vehementius purgās, & vomitoria . vnde nihil mirum esse debet, siquidem inter venenatos fungos connumerari debeat: cum nulla alia ratione nobis proffit, quàm quòd naturæ sit inimicum, eiq; negotium faceffat.

Oritur è saxo id est lapide Lyncurio siue lyncæo (inquit Theophrastus) fungus admirabili natura. Præciditur hic in esum, & alius subnascitur anno toto. Pediculi pars relicta, duratur in silicem, atque ita semper crescit lapis, restibili fœcunditate.

Sunt & igniarij fungi , quos tamen quidam malunt inter ligni recrementa connumerare, quàm inter fungorū genera. Sunt & alij, quibus strigilum vice tonstrinæ Italicæ vtuntur. Quinetiam vulgus nostrum vesfas lupinas appellat, fungorum quoddam genus amplum, coloris subruffi, membrana contortum , sub qua ater quidam pulvis continetur, interdum etiam muscæ numerosissimæ delitescant.

Perniciosissimus fungorum cibus, præser-

tim eorum qui in arboribus nascuntur. Familias hi nuper interemere (ait Plinius) & tota conuiuia: Anneum Serenum præfectum Neronis vigilum, & tribunos, & centuriones quosq; tanta voluptas ancipitis cibi. Atque hæc de fungis sunt satis. Ad lacus descriptio nem properandum.

Lacus.



LA C U S appellatione, non solum defluētes è montibus aquas in vnum collectas intelligimus: veluti sunt quæ hodie lacus Lemano^s, & Benacus dicuntur, quos circū, licet præta atq; adeo præpinguia arua fata esse soleāt, tamen latiore quadam significatione, ad eas etiamnum aquas lacum extendemus, quæ ex varijs fontibus in vnum locum defluant, perpetuamq; & viuam aquam contineant, quo nomine (inquit Vlpianus) à stagno differre potest lacus, quòd temporalem aquam capiat, quæ cum hyeme colligi soleat, æstate plerunq; exsiccatur. Possum etiam lacus nomine intelligere cum Varrone, vastum quendam locum, in quem aqua contineatur, quæ

lis Romæ fuit is quem à Q. Curtio lacum curtium appellarunt, qui erat tum locus palustris in foro, antequam cloacæ ædificari cœpissent.

Hoc loco describemus eas plantas quæ nō solum circa lacus ac stagna, verum etiam circa paludes atq; adeo flumina crescere solent. siquidem palus ob id dicitur, quod paululum aquæ in latitudinem diffusæ contineat: fluuius item, aut flumen, quòd in ijs aqua fluat. Ne igitur, & fluuius, & palus, ac stagnum, à nobis temere repetenda sint, solo hoc lacu contenti omnia cōplectemur quæ & ad paludes & ad flumina pertinebūt: fonticulum tantum prætermittentes, quem cum arbutō iam descripsimus.

HERBAE LACVSTRES.



Ncipiendum ab ea herba quæ lacubus & reliquis aquis stagnantibus plerunque supernatare solet. Nympham ob id vocarunt Græci quòd aquis gaudeat eāsq; peramare videatur. Plinius tamē à nymphæ, deductum ait esse nomen, quæ zelotypia erga Herculem mortua fuerit, & in eam herbā conuersa. vulgus seplasiariorū Nenuphar appellant, voce barbara & Arabica, potius quā nostra. Duplex est ea herba, radice ac flore tantum dissidens, Est enim altera, nobis satis

frequens, folio orbiculato, læui, crasso, herbaceo, amplo, pingui, in stagnantibus aquis supernatante: nunquam aquam continente, aut ea commadefcente, quantumuis immergatur profundius: flore candido, æstate media proficiente, lilio simili, & quum defloruerit, papaueris caput referente, in quo semen latum, amarum, pingue. Scapus gracilis est, & læuis: radix nigra & ampla, dulcis, nodosa, clauæ formam referens.

Alterum genus nymphææ simillimum est supradictæ, sed radicem albam gerit, asperâ, florem item luteum, nitidum, rosæ similitudine. Est & alia Plinio (quam ait in Thessalia plurimam reperiri) amne Peneo, radice alba, capite luteo, rosæ magnitudine.

Farranum, siue farfugium Plinio, herba nymphææ non absimilis, propter flumina nascens, populi folio, sed ampliore, unde populago herbarijs dicta: flore tum luteo, tum candido: Græcis chamæleucem vocari Plinius tradit: farfaram dici Dioscorides testis est, fortasse à Farfaro amne, quæ Virgilius Fabarim appellat in Sabinis. Iuxta pratorum vliginosorum aquas riguas, inuenitur herba, folio ferè nymphææ, breuiore tamen, sed pingui, & crasso, nunquam aqua madido, flore luteo, nitente, rosam quodammodo emittente: quem pratensem bacinum vulgus nostrum vocat. Ea fortassis herba inter nymphæarum genera connumeranda fuerit.

Potamogeton, herbam fluuialem græci appellarunt, à loco in quo nasci frequenter solet: nostri à foliorum similitudine, betā aquaticam, quòd betæ folia gerat: fontalem Plinius vocauit. Ea in vadis fluminum frequē emicat, betæ folijs, sed minoribus hirsutioribusque, per aquam expansis. cum nymphæa plurima prouenire solet.

Potamios stratiotes, hoc est militaris fluuiatilis appellata, quòd aquis supernatet, & vulnera militū ex oleo imposita cito persanet. Ea est radice pauca, aut nulla, similis aizoo, nisi maiora haberet folia: mirum in modum à Græcis celebratur, nasciturque tantum in Aegypto, ac Nili inundationibus, auctore Plinio.

Poterion in aquosis collibus nascitur, large fruticās, spinis retorrida, lanugine spissā, folijs paruis, rotundis, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, flore longo, herbacei coloris, gustu acuto & odorato. radices habet duas, binum cubitorum altitudinis, neruosas, candidas, firmas. ea quid sit apud nos, nondū satis constat.

Lentem palustrem antiqui vocarunt, quā vulgus nostrum lenticulam aquaticā: ea flore tantū conspicua est, in lacubus & stātibz aquis: sine radice, sine folijs: flos autem albus est, numerosus, stellatus. Quidam aliud gen⁹ faciunt lenticulæ non quidem in aquis, sed vliginosis locis dilutisq; nascentis, agriam

phaceam hoc est, syluaticā lentē appellātes.

Siler, non nisi aquosis prouenit, quasi pumila salix, molle siler à poëta dictum. frutex est, qui nōnunq̃ arborefcit, vt baculos rustici ex eo faciant ad serpentes abigendos, quē aiunt mirum in modum refugere. inter salicis genera annumerari creditur. Sefeli officinarū non est: nam hoc in montibus crescit.

Siler aquaticum vulgus seplasiariorum nominat (vt à sefeli montano distinguat) herbā in riguis frequentem, ac palustribus, apij folio, sed aliquāto maiore: caule cubitali, comofo, superne muscario: floribus luteolis, aut cādicantibus: radice crassā, sublutea, capillamentis maioribus quā sefeli fibrata. fuerit fortasse phellandriō Dioscoridis, quanquā potius esse autumēt quidam, eam herbam, quā filipendulam officinē nomināt. verum huius rei re copiosius admonebit Ruellius.

Saledragō Plinius ex Xenocrate describit, herbam leucacantho similē, palustrem, & spinosam: caule ferulaceo, alto, cui summo in capite inhæreat quiddā ouo simile, in quo procedente ætate vermiculos nasci tradūt, quapropter genus esse dipsaci crediderunt nonnulli, quod eius caput ouata specie conspiciatur, quo arescente ac dissecto, vermiculi reperiuntur.

Malacocissos, mollis hederā Democrito, herba est virens, hederæ simillima, in riguis nascens, lenta ac mollis, caule flexili, sese qui-

buscunq; vel frutetis vel arbustis inuolente. Ea est quam vulgus nostrum sigillum beate Mariæ nominat, quam in fruteto descripsimus.

Phleon, herba spinosa, dicta quòd copiose nascatur, præsertim Orchomenio lacu, & in Aethiopia Arabiæ aduersa, flumine præsertim quod cinnamo semina determinat (ait Strabo) nonnulli eam herbã (inquit Plinius & Theophrastus) stœben vocant, quæ quidem non solum caule est aculeato, sed & folio quoq; hispido: iuxta cuius spinas, aculeos etiam condit, radice non vsque adeo in profundum acta.

Phlion à phleo longe dissidere ait Theophrastus. In insulis fluitantibus prouenit, cuius lanugine, ad lixiuium mulieres vtuntur, molle & placentaceum est, colore subrubido. Fœminam in eo accipi tradit, quæ sit sterilis, ad nexus idoneam, marem prorsus inutilem: partemq; huius herbæ ab radice pueris cibo gratam esse: radicem ipsam, pecudum pabulo velli.

Sphondylion, olim herba rutinalis Romanis dicta, in palustribus & vligine cõmadentibus locis nascitur, folijs est platani diuisura, cætero similitudine panacis, caulibus magnitudine cubiti vel eo etiam amplioribus, fœniculaceis: semen gerit in cacuminibus, solis effigie, sed duplex & latius, cãdidũ, paleosum, graueolens, flore candido vel pallente, radice

alba,raphano simili.

Inuenitur in torrētium ripis botrys,fruticosa herba,tota colore luteo lāguens,multis stolonibus fusa, semine circa totos ramulos crescente,folio intubi.Immensum odorē spirat,ob id vestimentis ac linteis,curiose à matronis nostris interponitur,defertúrque Septēbri venalis per vrbe[m], vulgo pimentum regale clamitant.

Plantaginem aquaticam à foliorum similitudine nostri vocant herbā eam quam Alisma & Damasonion græci nominarunt:recentiores fistulam pastoralē, quòd singulari scapo,rudis fistulæ,& longitudinem & effigiem quādam videatur imitari.Cæterum folio est arnoglossi,in cuius fastigio viride alabastriculum(ait Ruellius)in calicem concoloris floris dehiscit:radicibus crebris,tenuibus,vt hellobori nigri,acribus,pinguibúsq; flore tenui,in candidum pallescente . Lacus, fluuios,& aquosos tractus amat.

Tribulus Plinio, non nisi in palustribus & residibus aquis nascitur, dira res alibi: iuxta Nilum & Strymonē amnes excipitur in cisbis,inclinatus in vadum, folio ad effigiem vlmī super aquas extante:pediculo longo:capitulis sub aqua merfis:caule per summa crassiore,inferne graciliore,capillamenta quādam spicacea gerente,postea autem semen durū,nucis ferē magnitudine,retusis aculeis aliisquot cinctum,cuius nucleo accolæ nō secus

D.iiij.

ac castaneis vescuntur, quo etiam in farinam permolito, annonæ inopia, panes interdum fiunt. Apud nos frequens est in stagnis & fluminibus: huiusq; nûces, castaneas aquatiles vocant, nonnulli saligos. Aliqui in stagnantibus aquis nascentes tantum cortice nigro fructus, à triangulari figura truffas nominare malunt.

Tribulos terrestres statuit Theophrastus, quorum vni cîcerculæ folium, alteri aculeatum tribuere videtur: vere germinant, serius tamen: cui in folijs sunt aculei, magisq; hoc circa septa villarum erumpit, semen habens rotundius, nigrius in siliqua. Eum tribulum quidam esse putant, quâ vulgo vocamus calcitrapam, quod sit siliqua spinarum vallo muricata. Hippocrates genus tribuli maritimum refert, idem cum terrestri, quod minus est aquatico.

Epimedium Plinio, in humidis nascitur, caule non usque adeo procero ac magno, hederæ folijs, denis ac duodenis, nunquam florens, radice tenui, nigra, graui odore.

Ocimum aquaticum vocat vulgus eam herbam quæ græcis erinos, Galeno echinos, aliquibus ocimoides dicitur, secus amnes fontesq; nascitur, ocimi similitudine, sed folijs minoribus, & superne diuisis. Palmo alta est herba assurgit cauliculis quinis senisve, flore candido, semine nigro, acerbo, huius etiam caulis & folium, madet lacte multo, vnde à quibusdam

ex vulgo, lactaria dicta est.

Peristereon quam columbariam vel columbinā quivis nominare poterit, in aquosi nascitur, Romani cristam gallinaceā & trixalidem aut exuperam vocant. Herba est altitudinis palmi, aliquanto maioris, folia gerit incisa, subalbida, exuperantia à caule, qui ei vnicus, quemadmodum & radix sola inest.

Sida frutex est lacustris: Orchomenio lacu frequens (ait Theophrastus) specie papaveri similis, tale etenim caput gerit nisi quod amplius est: roseo flore, folijs herbescentibus: vasculo mali amplitudine, candidis membranis obducto, semine intus rubro, gustu triticum æmulante. Caput & folia super vndas emicant, mox quum defloruit, inclinatur in vādum semēq; spargit. Cibo idonea est Sida, cuiusq; folia ouiū pabulo grata, germina suillo pecori, fructus hominibus estur.

Nūc describenda sunt iuncorū genera, quorum stagnantes & lacustres aquæ plurimum abundare solent.

I V N C I P A L V S T R E S.



Vncum Græci schœnon vocāt: quod eo ad funes antiqui vteretur (Caue autem schinon dicas, nam lentiscum significat.) Huius plura sunt genera. Est enim palustris iuncus, quem græci λῆον hoc est

D.iiij.

læuem vocant, siue schœnon helion, in aquis sponte nascens, crassitudine & magnitudine fungosq; medulla insignis, omnium maximus & mollissimus. Theophrasto mariscus vocat⁹, à magnitudine, vt Barbar⁹ autumat, græcis holoschœnos, Galeno oligoschœnos. hic ad vitilia præfertur. Videtur autē (ait Plinius) Iuncus palustris, idem cum scirpo esse, ex quo prouerbum sit natum, Nodū in scirpo quæris. Est enim hic iuncus aut scirpus, fragilis, ac læuis, admodum procerus, enodis, & sine fronde (ait Festus) ad tegetes & vitilia vtilissimus, quoniam mollis carnosusq; est, cuius etiam detracto cortice, candelæ luminibus & funeribus seruiunt. Hic tamen nec in veprium cauliumve, nec in herbarum aliove villo q̃ suo genere numerari potest.

Alter iūcus acutus à nostris, à græcis oxy- schœnos nominatur: eum esse autumat Barbarus, quem iuncum marinum appellamus: etsi iūcum marinum, vel iomarinum, vulgus nostrū appellare soleat fruticis genus, in mōtib; & apricis nascens, quo sepes tam viuas q̃ struētiles stipant. Neq; desunt qui genus aliud fruticis in litoribus maris satis frequens iuncum marinum appellant, eūque esse cōtendāt, qui Dioscoridi & reliquis tragos vocetur. Cæterum acutus hic iuncus de quo sermo est, sterilis esse existimatur, idēmq; mas: qui se quotannis regenerare possit, cacumine in terram defixo, ex quo cepitiæ radix

denuo pullulet.

Tertium genus melancranida vocant quæ si iuncum atricipitem, melancræna dicitur Straboni. frugifer & atrifer à nigro semine Theophrasto. Fructum is gerit vuarum coherentium modo, in quibus cuspidatum semen clauditur. hoc nihil in vliginosis occurrit frequētius. Proinde is in callum de regulari furculo intumescit, mox veluti oua parit: circumdantes enim spicatum geniculos iunco lineari affixos initio gerit: quorū summitatibus paululo latiores orbes vasculorū leuiter hiscentes inducit. His semen exiguum effigie cuspidis sagittarum gerit, nigrum, nō absimile semini herbæ inguinalis, verū paulo exilius, radice longa adhæret, multoq; crassiore q̃ acutus. Ea omnibus annis moritur, dein altera rursus à iunci cacumine defigitur: quod vel ipso visu percipi facile potest, quippe aliæ radices siccæ, aliæ virides ac demissæ cernuntur. Caput huic iunco cæpis & gethyis est simile, vtpote quod in vnum ex pluribus conglobatum prælatumq; inferius tegumentisq; subrubris intectum constet.

Iuncum odoratum, græci insigni appellatione schoenon, nullo alio addito appellare consueuerunt: quod Scribonius adhuc retinuit: Hippocrates tamen, schoenon myrepicon, id est odoratū, & schoenon hedyosmon, id est suauem vocauit: Celsus, iuncum rotundum appellare maluit, vt ab angulari distin-

gueret, quem cyperum vocamus. Prouenit hic iuncus odoratus in Arabia, Syria, arque Africa. Quanq̃ & in Campania inueniri quidam dixerint, sed minus pollentem: eum vis nosc̃ esse mordacitatis ipso gustu perhibet, florémq; confricatum rosæ odorem emittere: Cæterum viridem, pauci aut nullius esse odoris, siccatum, peroptimi. In Aphrica autē qui nascitur, sine odore est, omniū pessimus. Proinde iuncus is, teres est, scapo exili, rubente, fragmentis in purpuram vergentibus, flore copioso, quem Hippocrates, & post eū Galenus, schoenu anthon vocarūt (etsi squinantum nostræ officinæ iuncū ipsum appellant) vulgus pastum camelorum.

Iuncus triangulus græcis cyperus dictus: Plinio iuncus angulosus, in palustribus emicat, cubitali & amplius proceritate, ab imo candicās, fastigio niger, carnosusq; folijs porro exilioribus, solidioribus, dorso aliquantulum cultellato, paniculis in caulis cacumine depēdentibus, inter quas semē occultitur: stirpibus tum longis, tum rotundis, in oliuas inter se connexas extuberantibus, atq; inuicē perplexis, nigris, suauiter olētibus, gustu subamaris: Sochetum rura nostra appellāt, cuius radicem quæ odorata est, Iunio mēse erūūt, digerūtque stipites in manuales fasciculos, quos prius insolatos, aceti imbre cōspargūt, siccatoq; frustatim tundunt, vt sua odoris gratia vestes interpositi commēdent. Celsus,

nulla ratione hunc iuncum quadrangulum appellat, quemadmodum & vulgus seplasia-
riorum, iuncum quadratum. Sunt præterea
qui gladiolum pseudocyperum vocent.

Cyperidis folio in palustribus, & circa sta-
gnantes aquas erumpit, quæ græcis typha di-
citur, albido caule, alto, læui, plano, enodi, cu-
ius cacumen densa florum congerie stipatur,
& veluti spissa quadam lanugine capitatur,
quæ in pappos tandē euanescat, rura nostra
(inquit Ruellius) massas apposite vocauerūt,
quòd sceptra regū, massas vulgo dictas per-
politus caulis, lanosa floccorū dēsitare, sum-
matim fastigatus æmuletur. Cæterum de ce-
reali typha, in agro dicemus.

Gladiolus Plinio, Cyperus est: multi enim
non distinguunt à cypero, vicinitate nominis
fallente. is tamen est radice bulbosa, & dolci:
quæ decocta, panem gratiorem faciat, vt in-
quit Theophrastus. sparganion aliqui, & xi-
phidion vocarunt, quòd folia habeat gladij
cuiusdā forma, verū arctiore, inclinatioreq;.

Iūcum cabacinum vulgus nostrum vocat,
fruticem palustrem in Orchomeno lacu plu-
rimū, qui butomus Dioscoridi appellatur, ab
eo quòd tam viridis herba q̄ cōditium fœ-
num, boues pascat, eiúsq; sectiuo victitent pa-
bulo. Caule est inoffensissimo, peculiari quo-
dam læuore, folio arundinis (inquit Theo-
phrastus) angulari, fructu nigro, mali ampli-
tudine, sexu duplici: mas fœcundus, fœmina

ad vitilium nexus utilis. Pars ab radice tenera manditur, puerorum cibo grata. Proinde cabacinum iuncum vocarunt nostri, ob hoc præsertim, quòd eius folijs, tegetes & sportulæ sicut & sparto texantur (ait Ruelius) nam corbularum quibus ficus & passas recondunt, nostri corbas, vel potius cabas solebant appellare.

Iuncos lapideos apud mare rubrum vocatum in Arabia paulò à Copto superius prouenire refert Theophrastus: quos nemo visu à veris potuerit discernere. Atq; hæc de iuncorū differentijs. De arundinibus dicendū est.

Arundinetum.



INTER aquaticos fructus principatum tenent arundines, belli pacisq; experimentis necessarie, atq; etiam in delicijs gratæ (inquit Plinius) quapropter ab antiquis plurimo artificio circa fluminum ripas, humectisq; locis excolebātur, quæ arundineta appellabant, ex quibus ad rusticanas domos cōtegendas, Septentrionales populi materiam expetebant; Romani vero perticas, aut palos,

ad vites sustinendas ac fulciendas: vnde illis in cōsuetudine positū erat, vel ex Catonis de creto, vt iuxta vineta etiam arundineta consererent: in ternos pedes arundinum oculis dispositis: solo prius bipalio, minus tamen alte, pastinato: ita enim faciendū Varro & Columella docent.

Arūdinū natura aquatilis est, lignosior atq; robustior, vt quibus orientales populi non apud nos modo, verum etiam apud antiquos bella conficere soleāt. vnde etiam hodie videmus, ex India, atq; insulis nouissime reperi-
tis, tela calamis arundinaceis cōfecta, quibus in bello vtuntur eius regionis populi: quod satis accedere videtur ad id, quod de calamis qui in Rheno, Bononiēsi amne, atq; adeo in Creta crescūt vt refert Plini⁹, quibus nullos sagittas aptiores ait nasci, vnde sagittarias arū-
dines Creticas vocat Theophrastus, quando his præferantur Indicæ, quibus ait Plinius arboream inesse amplitudinem, vt nauigiorū vsum præstare possint, hastarūq; vicē præbere, additis cuspidibus. Calamis itē orientis populi spicula addebant, irreuocabili hamo noxia: sic enim refert Plinius. Quod vt obiter interpretemur adolescentulorum causā: reperiemus, id ferrum proprie appellari spiculum, quod extremo telo additur, ad vulnus infligendum: At vero quod ait eosdem populos mortē accelerare pinna calamis addita, id aliud fuisse existimare nō possum, q̄ ex

tremam partē squillæ, quæ ostrea est Adriætico mari plurima, turbinata effigie, cuius extremum quod cuspidem referre videtur, pinna dicitur: quam satis eleganter describit Cicero, libro secundo de natura deorum. Atq; id obiter dictū fuerit adolescentulorū causa.

Chartis etiam seruiunt calami tenuiores, ac minus crassi, præsertim Aegyptij, cognitione quadam papyri (inquit Plinius) Creticis hodie tota Italia vtitur, quorum cuspidem igne induratum, atq; ita concinnatum, ad scribendum aptissimum efficiūt, ab antiquioribus græcis hoc in primis mutuati. Belgicis autem nostris calamis, nulla est gratia, quæ cum reliquis conferri possit, nisi ad coslos muliercularum inseruire quis dicat, quod nostris Carnutēsisibus ac Vindonicis satis est commune. Arundinū calamorūmq; differentia, mox describendæ, quæ nostratibus atque adeo externis nationibus, frequentes esse solent.

Arundinem græci κάλαμος vocarūt, Phœnices gingen (ait Barbarus) ob Adonin quē ita appellant, quēmq; magnopere lugent: vulgus nostrum, *roseau* appellat, & Arundinetū, *rosaye*: quidam, cannam vocare malunt: quod nomen communissimum esse ad ea arundinum genera refert Theophrastus, quæ apud flumina & lacus potissimum nascuntur. Verum cannæ appellationem, suis temporibus ait Columella, ad gracilem & degenerem

arūdinem magis propriam esse: licet & apud Pollucem sit, canna fiscellæ ac vasis viminei genus.

Arundinum multa sunt genera, quæ differentijs vel sensui manifestis discernuntur. Quædam enim sunt densa tam carne quàm geniculis: quædā rara paucisq; geniculis: aliæ concavæ, aliæ breues, aliæ proceræ atq; excel sæ: nonnullæ graciles & foliosæ reperiuntur, quædam crassiores, minúsque foliosæ. Multæ quoque calamorum differentiæ, pro natura vsûq; ipsarum intelligi possunt: singulæ nanq; ad singula vtilis, quapropter nomina etiā secundum hæc differentiās variare atque mutare solent: quemadmodum particulas tim mox explicabimus.

Canna siue arundo vernacula, quæ græcis donax appellatur (Cypriam vocat Plinius) nostris lacubus frequentissima est, omnium fruticosissima: caule confurgit geniculato, tereti, ac fistuloso, qui mox ienescens, fissili inarescit ligno, in leue fastigium cacuminato: circa quod densius excrescit tomentum, ad faciendas cauponias culcitræ non inutile, quod veluti plumeū florem videtur vocare Galenus, atq; affirmare anthelem à quibusdā appellari, qui flos si in alicuius aures incidat, adeo tenaciter hæret, ut auelli non possit: Bombycis similitudinem quædā gerit hoc tomentum: quapropter eas arundines quæ multo eiusmodi tomento abundarent, bom-

bycinasopinor à Theophrasto vocatas fuisse. folia gerit, ex articulis alterno laterum gradu emergentia: membraneo cortice, calamū conuestientia, vsq; ad medium internodium: hinc enim à cauo alarum sinu resupinātur, procūbente languido promissioris comæ vel paniculæ pondusculo. Radix multis quoque geniculatur articulis, fœcunda stirpe, vt quæ vel adusta, vel recisa, lætius numerosiusque reuirescat.

Arundo, Sagittaria, Dioscoridi nastos, hoc est farcta dicitur, quibusdam onascos. Ea est qua apud Indos & quasdam alias nationes tela ac sagittæ fieri solent, vnde illi nomen: toxicam vocat Theophrastus: atq; à quibusdā Creticam vocari contendit (quanq̃ ex Creta scriptorij calami nunc ad nos proueniant) proinde, omnium est carnosissima, paucis nodis geniculata, maximèq; flexum recipiens, atq; omnino obsequēs quo libeat flecti, si calesacta fuerit.

Fistulariam appellant arundinem quæ græcis syringias dicitur, quòd tota sit concaua ac fistulosa, nihilq; fere ligni carnisq; habeat. Plinius autē ait eam ita vocari, quòd ad fistulas sit vtilissima.

Characias arundo, hoc est vallaris, crassa & valida est, cæteris longior, sed vermibus obnoxia: vulgo Italorum hodie græcanica dicitur, atq; à Vitruuio, Cerdone græca. Eā esse puto q̃ cacumine est toroso, fusca lanugine

puluinato: nostræ regioni satis frequens, præfertim circa ripas exspatiantis lacus. vallatoriã vertit Gaza in Theophrastũ, aĩtq; nasci in comythibus, quæ sunt arũdinetæ stagnorum pinguiæ & læta, in quibus aceruata arundo, muto radicũ implexu cõtorqueĩ ac conuoluit.

Nexilem vel flutam arundinem, Plotiam, siue Plocimon appellarunt Græci, circa Orchomenium lacum frequentem, vti & superior, longe tamen graciliorem atq; imbecilliorẽ, ex qua tegulæ fieri possunt. In insulis fluitantibus (quas græci Ploadas vocant) nasci solet: in immensum prælatis ijs quas Cephisus amnis abluisset, vt cecinit Pindarus.

Indicis arũdinibus arborea est amplitudo, quarum vsus hastarum vice esse possit, modo præpilatæ fuerint, hoc est cuspidibus additis. Odorum vnguẽtorũq; causã nasci Indicas & Syrias arundines refert Plinius: è quarum radicibus (vt Solino placet) succus exprimitur ad suauitatem mellis, quasi saccarum interpretari possis. Folia gerunt omnium arundinum, longe breuissimã. Subrectarum longitudo, triginta ferè passus: humi vero serpentiũ, quinquaginta: Crassitudo, cubitorũ ternũ interdum etiam senum, quod se non posse credere ait Strabo. In marem & fœminam Indicam arundinem diuidũt, aiũtq; spissius marem corpus gerere, fœminã capacius. Nauigiorũ vsum præbêt huiusmodi arundines, singulis earum internodijs circa Acesinã marem.

xime amnē, ternos homines capiente alueo.

Arundines quasdam in æquinoctiali plagâ, Australi quadam insula, nasci refert Diosdorus, fructū candidū, eruo similem gerētes, è quo suauissimus panis conficiatur. æq; fabulosum, atq; illud quod in eadē insula, duas ait herbas nasci, supra quas iacētes, placidissimo somno moriāt. Certe quosdā Aethiopes, radicibus arundinū in farina tritis victitare aiunt, atq; ob id rhizophagos appellatos esse.

Armamentariam arundinem nuncupauit Theophrastus, vel quòd ex ea vinearum pedamenta fierent (quæ nonnunq̃ armamenta Plinius vocat) vel q̃ ex ea armamenta fierēt ad inclusos cantus, ita enim Plinius interpretari visus est. Gaza autem interpretari videtur armamentarias arundines, quū in amplitudinem aucupatoriam adolescūt, vnde etiā aucupatoriæ dictæ. Distant à reliquis arundinibus (vt in vniuersum capiamus) præstantia quadam naturalis nutritionis. Plenior enim eam referunt nasci, carnosior, in totūmq; facie fœminæ lasciuiorē spectari. Etenim foliū amplius, candidiūsq; gerit, minusq; habet lanuginis, q̃ cæteræ: vt ex ijs quædā omnino lanugine carere cōspiciat, quā obrē spadones appellatas fuisse cōpertū est.

Est & in Italia nascēs Adarcha nomine (inquit Plinius) palustris quidem, ex cortice sub ipsâ coma: vtilissīma dentibus, quoniam vis eadem est quæ sinapi.

Laconica cognominata arūdo,folijs est versicoloribus,ac varijs(quo nomine ab alijs differt) ab vna parte densioribus, quales in totum circa stagna gigni putāt,dissimiles amicis:longisq; vestiuntur tunicis,spatiosius à nodo scandente complexu.

Elegia arundo obliqua,vluginosis locis frequens,humilis contra aliarum naturā,graminis modo in terrā sparsa:cibo,dū adhuc tenera est,animalibus gratissimo(ait Plinius)masculā solidā esse aiunt,foeminā vero inanē.

Tibialem arundinem,aut verius musicā,in Orchomenio lacu plurimā,auletron calamū græci dixerūt.Nascit̃ plurima inter Cephisū & Nolanā, qui locus Pelicania dicit̃: hodie ex Siciliæ insula Thermitano agro sita, laudatur(inquit Solinus) Tibijs cōficiendis vt̃lissima est,vel ea maxime ratione,q̃ cōtinuo foramine sit peruia(inquit Plinius)Ea arūdine pastores antiqui sua carmina cōcinebant: vnde illud Virgilij: Et tibia inflare leues, & dicere versus.erātq; theatris peculiaris,ad comœdiarū cantus rusticos,quapropter comœdiā dicebāt actā fuisse,tibijs parib⁹,dextris& sinistris:aut imparib⁹,quæ Serranæ dicerent̃. Quod si libeat intelligere,facile quidē percipies ex Theophrasti descriptiōe. Etenim hac arūdine(inquit)tibiarū paria optime fiebāt,cædebanturq; tēpestiue in hūc vsum,vsq; ad Antigenis tibicinis tēpora;quum adhuc simplici musica vterentur,hoc est aplasto:prēpar̃
E.ij.

rabántq; muscas arundines ferè in hūc modū. Cū collegissent arūdinē, hyeme, sub dio, suis vestitam tunicis exponebāt: vere autem, dispoliatā, attritūq; expurgatā expandebant ad solē: ac mox sequēti æstate cōcisam in internodia, rursum sub dio ad certū tēpus relinquebāt, omisso cū internodijs superiori geniculo, ad oris tibiæ cōformationē: cuius tibiæ lōgitudinē nūq̃ palmo minorē efficiebāt. Vocabántq; has tibias interdū puellares, & virginales, quæ hemiopi hoc est semiforē essent, minores atq; imperfectę: vel diopi hoc est biforē. Interdū viriles quæ pares erant, hoc est, inuicē iunctæ, atq; ex eadē canna æqualibus cauernis cōstructę: quarū apud Phryges dextra vnicū tātū habebat foramē, sinistra, duo. Erāt & impares tibiæ, Sarranę appellatę: quarū altera lōgior, altera breuior erat: Verū hæc quidē ita inter se cōiunctæ erāt, vt vnica tātū appareret, atq; id quidē euphoniæ causā. Cæterū optimę erant tibię ex internodijs, ad pariū constructū, vt mediæ totius arundinis partes, quę aduersum germina exeūt, mollissimæ paria gerant: durissima quæ proximæ radici habētur. Quin & ex eadē arundine ligulas tibiærū optimas eximebāt, quas vulg^o nostrū vocat, *des anches*. Easq; ita tibiæ infigebant, vt alterā dextrā, alterā sinistram appellerent. Atq; hoc imprimis operā dabāt, vt ex eodē internodio linguā colligerēt, ne discors esset. proximā ab radice sinistrā imponebāt:

dextram quæ germina versus pateret, inciso
 duas in partes internodio. Quinetiâ os lin-
 guæ vtriusq; secundû calami incisuram effor-
 mabât, neq; existimabât satis bene cõgruere,
 si quo alio modo linguæ cõficerẽt. Ante An-
 tigenis tẽpora nõ erât linguæ præparatę vti-
 les, nisi prius aliquot annis adseruatæ atq; ex-
 iccatæ, multaq; exercitatione perdomitæ, vt
 canere tandẽ edocerent (ait Plinius) atq; ita
 ora linguarũ cõprimebantur, quod erat illis
 Theatrorũ moribus vtilius, sic enim refert
 Theophrast⁹. Verũ posteaq; varietas fictiõq;
 accessit, & cantus luxuriãtes, tũ quidẽ cæsura
 mutata est, atq; ita effectũ, vt vtilis in trima-
 tu fierent, apertioribus ligulis ad flectendos
 sonos, linguæ enim disiectu deflectebat: quod
 ijs necessariũ esse existimabant, qui sonos fin-
 gerent, & multifariã inflecterẽt. Verum post
 hæc antiquissima tẽpora, Plinij sæculo fieri
 cõperũt sacrificę Thuscorũ tibie, è buxo: Lu-
 dicræ vero, loto, ossibúsq; asininis, atq; etiam
 argento: Arundinibúsq; tantũ utebantur ad
 tiliarũ ligulas, quemadmodũ & hodie quoq;
 apud nos in more positum esse videmus.

Calamus odoratus, vel (si mauis) aromati-
 cus, Hippocrati myrepicos, Plutarcho Ara-
 bicus dictus: ab India, ac Syria, ad nos hodie
 defertur: estq; etiam in Arabia frequens, circa
 lacum Gennesaretidẽ in conualli stagnanti-
 bus ac palustribus eius lacus aquis conferto,
 quæ tamen palustria æstate desiccari ait Plin⁹

nus, atq; facilius ijs desiccatis calamos colligi. Caue autē ne intelligas, calamos desiccatis paludibus gigni. Nā hoc oībus arundinibus peculiare est, vt in aquis crescāt. Proinde hic calamus, Arūdini simillimus est aspectu, multis geniculatus nodis, fuluus, tactu molli, & quū frangitur scissilis, intus araneosus, casia gustu, fragrantissimo odore, vt locū in quo nascitur ingrediēti, spiritus suauissimus statim aspiret: mollior est tactu (ait Plinius) meliōtq; qui minus fragilis, & qui assulose potius q̄ raphani modo frangitur. Nā raphanus frāgitur frustulatim nō assulose: quod est per lata quædā fragmenta quas assulas antiq; vocabant, veluti quū marmor cēdit: ea enim antiqua vox est. Inest præterea huic calamo (ait idē author) araneū q̄ vocāt florē. Ceterū, qui ex nostris seplasiarijs calamo aromatico carent, ij solēt minus tritis medicis ostēdere radicē acori, cuius geniculi atq; etiam odoris quædm suauitas, item color, nonnihil ad calamū aromaticū accedere vidētur. quāobré ea radice interdū pro calamo odorato vti solēt, haud sec⁹ atq; cupressō p xyloaloē.

Papyrus, aut (si voles) papyrum, in Syria etiam nascitur, circa eum lacum, quo & calamus odoratus (inquit Theophrastus) eam vero inter arundines connumerare non verbor, etsi nonnihil ab ijs differre videatur. Nascitur & in palustribus Aegypti (vt refert Plinius) aut quiescētibus Nili aquis, vbi eas